

**SEI**

06, 07, 08, 09 e 10 de Maio

FATORES DE RISCO PARA SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA-REVISÃO INTEGRATIVA

Andréa Cristina Alves[1]; Jamila Souza Gonçalves[2]; Frederico Silveira Santos[3]; Aline Siqueira de Almeida[4]

INTRODUÇÃO: Suicídio é uma violência autodirigida. A estimativa mundial de suicídio é de 16 suicídios para cada 100 mil habitantes, variando de acordo com o sexo, a idade e o país; entretanto, observa-se que nos últimos 45 anos as taxas aumentaram cerca de 60% em todo o mundo. Na atualidade, o suicídio constitui-se como um problema de saúde pública, de âmbito mundial, pois em muitos desponta como a terceira causa de morte entre indivíduos de 15 a 44 anos e a segunda principal causa de morte entre indivíduos de 10 a 24 anos. **OBJETIVO:** identificar e sintetizar quais os fatores de risco associados ao pensamento suicida, tentativas e suicídio na adolescência no período entre 2013-2018. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a partir da Biblioteca Virtual de Saúde e Web of Science, realizada nos meses de março e abril de 2018, com os seguintes descritores: “*fatores de risco*”, “*suicídio*”, “*adolescente*”, e suas variações nas línguas inglesa, pesquisados nos dicionários *DeCS* (Descritores em Ciências e Saúde) e *MeSH* (Medical Subjects Headings), combinados entre si com os operadores booleanos “AND” e “OR”. **RESULTADOS:** Com base em critérios estabelecidos para a revisão foram selecionados e analisados 11 artigos originais. Da análise emergiram as seguintes categorias: *características dos artigos selecionados e fatores de risco para tentativa de suicídio e suicídio em adolescentes*, 45% dos artigos analisados foram dos Estados Unidos. Com relação às diferenças de gênero, observou-se que as tentativas de suicídio são mais frequentes em meninas, porém, a morte por suicídio é maior em meninos, pois eles utilizam-se de meios mais brutais em suas tentativas. Dentre os principais fatores de risco, destaca-se os transtornos mentais (depressão, ansiedade, transtornos de personalidade), abuso sexual, abuso de substâncias lícitas e ilícitas, bullying, relações parentais, desenvolvimento escolar, como tendo um papel importante no desenvolvimento de pensamentos e comportamentos suicida. **CONCLUSÃO:** Conhecer os principais fatores de risco associados ao suicídio e as tentativas de suicídio na adolescência e as diversas maneiras de apresentação dos sinais a eles associados pode ser um passo importante para o planejamento de programas de prevenção e valorização da vida.



SEI

06, 07, 08, 09 e 10 de Maio

Descritores: Fatores de risco; Suicídio; Adolescente.

[1]Docente IFSULDEMINAS campus Passos,Mestre, andrea.alves@ifsuldeminas.edu.br.

[2]Docente IFSULDEMINAS campus Passos,Mestre, jamila.goncalves@ifsuldeminas.edu.br.

[3]Enfermeiro, Especialista em Gestão em Saúde Mental, Prefeitura Municipal de Passos, ssfredyy@yahoo.com.br.

[4]Doutoranda, EERP-USP, Mestre, linejm@usp.br.